



Ózdi Almási Balogh Pál Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
3600 Ózd, Béke u. 1-3.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ és BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

CSÁSZÁRMETSZÉS

Beteg neve:.....TAJ:.....

Születési név:.....Születési idő:.....

Kedves Betegünk!

Mielőtt hozzájárulását adja az általunk javasolt orvosi ellátáshoz, műtéthez, kérjük, ismerkedjen meg a beavatkozás lényegével és lehetséges kockázataival!

Döntését tiszteletben tartjuk majd, és a legjobb tudásunk szerint azon leszünk, hogy a szóba jövő szövődeményeket elkerüljük, hogy gyógyulását a szakma szabályait betartva, a tőlünk elvárható legnagyobb gondossággal elősegítsük.

osztályvezető főorvos

Beindult szülés (szülőfájások, magzatvízfolyás, vérzés) esetén a felvételi vizsgálatot (hüvelyi vizsgálat és magzati szív működés-vizsgálat) követően szülőszobára vesszük fel a szülő nőt. A szülőnőnek a szülőszobára érkezéskor kórházi ruhába kell átöltöznie. Az előkészítés elemei a beöntés (ajánlott, de nem kötelező), és a borotválás. WC használatát, zuhanyzás követi. Ezt követően vajúdobba vagy szülőágyra fektetjük a szülő nőt. A vajúdás, illetve a szülés időtartalma előre nem meghatározható, akár több órás is lehet. A vajúdás alatt a szülés előrehaladásának megítélése érdekében többször is történik majd hüvelyi vagy végbélen át végzett vizsgálat. A magzat szív működésének és aktivitásának, a fájások intenzitásának, gyakoriságának, erősségének észlelése céljából CTG fejeket rögzítünk a szülő nő hasára, ha szükséges a fájásokat oxytocinos infúzióval erősítjük. Ha bármely ok miatt nincs ágyhoz kötve a szülőnő, akkor vajúdás alatt többször is felkelhet, sétálhat, a szülésznő által megszabott körzetben. Túlzottan erős, nehezen elviselhető szülőfájások esetén a fájdalomkat nitrogén-oxidul gázkeverék fájások alatti belélegeztetésével, vagy alternatív vajúdási technikákkal (vajúdó labda, vajúdókád) csillapítjuk. A szülő nő kérése esetén a férjével, esetleg más hozzátartozójával történő együtt szülés feltételeit biztosítjuk (egy hozzátartozó lehet jelen). Vajúdás alatt az elvesztett energiát szőlőcukorral, kevés folyadékkal (nem rostos és nem szénsavas) javasoljuk pótolni.

Amennyiben a terhesség alatt vagy a szülés során olyan betegség, illetve szövődemény lépne fel, amely a hüvelyi szülést lehetetlenné teszi, vagy a hüvelyi szülés az anya vagy a magzat biztonságát, egészségi állapotát veszélyeztetné, akkor császármetszést kell végezni. Ez többnyire gerinc közeli (spinális) érzéstelenítésben, ritkábban altatásban történik. Az esetek többségében haránt irányú, ún. bikini-metszést végzünk, kivéve, ha korábban valamely okból már hosszanti metszést végeztek a hasfalán. A műtét néhány deciliter vér elvesztésével jár, nagyobb vérvesztés esetén vérátömlesztés válhat szükségessé.

Az újszülött ellátása osztályunkon a WHO és az UNICEF által javasolt „baba-barát” módszerek alkalmazásával történik.

A császármetszést követően a szülő nőt és az újszülöttet ún. „Rooming-in” kórteremben helyezük el, ahol a nap 24 órában együtt lesznek majd. Ha a szülést vezető orvos vagy az osztály gyermekorvosa úgy ítéli meg, az újszülött, főleg pedig a koraszülött biztonságos ellátása érdekében a gyermeket BAZ Vármegyei Kórház Koraszülött Intenzív Osztályára helyezük át. Az áthelyezés indokoltá válhat koraszülést követően, vagy az újszülöttnél szülés közben, ritkán, a leggondosabb észlelés és szülésvezetés ellenére is bekövetkező átmeneti oxigénhiánya, sérülése, adaptációs zavara, illetve valamilyen betegség tüneteinek észlelése miatt.

Esetleges további kockázatok, szövődmények: A gyermekágyban ritkán előfordulhat lázas állapot, emlő- és méhgyulladás, vagy hasfali seb gyulladása, esetleges szétválása is. Az injekciós és infúziós tűszúrások helyén kialakulhat visszérgyulladás, a farba adott injekciók helyén tályog. Szeptikus állapotot előidéző és antibiotikumokkal eredményesen nem kezelhető méhgyulladás miatt nagyon ritkán hasi műtét és méheltávolítás válhat szükségessé. Császármetszés alatt előfordulhat aneszteziológiai szövődmény, húgyhólyag-, húgyvezeték vagy bélsérülés. A gyermekágyas időszakban utóvérzés, a méh vagy a hasfal elvarrt sebének gyógyulási zavara. A túlzottan elvékonyodott méh műtét alatti továbbrepedése vagy a méhizomzat összehúzódó képességének zavara miatt olykor komolyabb vérzés indulhat. A lepény idő előtti leválása által előidézett vérzékenység miatt szükségessé válhat akár a méh eltávolítása is. A magas vérnyomással, fehérjevizeléssel és vizenyővel járó ún. terhességi toxaemia elhanyagolt esetekben, néha pedig előre nem kiszámítható ún. eclamsziás görcsrohamot idézhet elő. A vér alvadékonyságának terhesség alatt észlelhető fokozódása – visszeresség esetén szülés alatt vagy a gyermekágyban - trombózis és embólia veszélyével fenyeget, melynek kialakulását korai mobilizálással, LMWH adásával előzzük meg. Ez utóbbiak szerencsére rendkívüli ritka szövődmények.

Tervezett műtét előtt, a kivizsgálás részeként minden betegünket anaesthesiológus szakorvos vizsgálja meg. Az ő javaslata alapján szükségessé válhatnak további vizsgálatok és speciális gyógyszer előkészítés is. Minden szüléshez jól felkészült szakorvost, fiatalabb kollégák mellé jól felkészült kollégát biztosítunk. A szülés észlelését és vezetését a szülészeti ellátásban jártas, jól felkészült szülésznők végzik.

A betegeket kiválóan felkészült aneszteziológus orvos altatja, illetve érzésteleníti. Az ápolást a betegellátásban jártas ápolószemélyzet végzi.

Kérelem: A fentieket elolvastam, a leírtakat tudomásul vettem, a javasolt műtét szükségességéről, elmaradása esetén annak egészségkárosító következményéről, a tervezett műtéti érzéstelenítés előnyéről, esetleges mellékhatásáról, következményeiről írásban és szóban tájékoztatást kaptam. További felvilágosítást, tájékoztatást nem kérek. Bízva a javasolt és általam elfogadott műtéti megoldás sikerében, kérem az orvosaim által szükségesnek tartott műtét elvégzését.

Ózd, 202.....

.....
felvilágosítást végző orvos

.....
beteg olvasható aláírása

.....
vagy a törvényes képviselő aláírása

Törv.képv.neve:

Szül.hely,idő:

Lakcíme:

Az Eü.törv.15.§.(5) bekezdése szerint az intenzív beavatkozáshoz a beteg, írásbeli, vagy – amennyiben erre nem képes – két tanú együttes jelentésében, szóban,vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.

.....
(1) Tanú aláírása

(1) Tanú neve:

Szül.idő:

Lakcím:

.....
(2) Tanú aláírása

(2) Tanú neve:

Szül.idő:

Lakcím: